

Wie zijn wij?

LOGOPEDIE-ACHTERHOEK

LOGOPEDIE-ACHTERHOEK

Philippine Huiskamp is sinds 1991 logopediste en heeft de studie spraak- en taalpathologie gevolgd. Zij heeft enkele jaren in Duitsland gewerkt. Naast haar werk in de praktijk werkt zij bij het Observatie- en Adviescentrum de Trein in Terborg.

Paul Waanders is sinds 1984 logopedist, heeft een onderwijsbevoegdheid en is Parkinson- en MS therapeut. Hij heeft sinds 27 jaar een eigen praktijk in Zelhem.

Zowel Philippine Huiskamp als Paul Waanders zijn gecertificeerde therapeuten en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister met de aantekening Preverbale Logopedie.



De Oldenoord 25
7021 NJ Zelhem



Raadhuisstraat 20
7251 AB Vorden



0314 62 17 58



06 18 22 23 12



www.logopedie-achterhoek.nl




info@logopedie-achterhoek.nl



**Logopedie en
orthodontie**

*De behandeling van afwijkende
mondgewoonten*



Correct monddedrag. De lippen zijn gesloten en de tong ligt achter de tanden.



Open beet.

Algemeen

In ons hele lichaam is het van belang dat onze spieren goed met elkaar samenwerken. Dat geldt ook voor de spieren in de mond.

Bij alle handelingen, die we met onze mond verrichten zoals bijvoorbeeld kauwen, slikken en praten, zijn veel spieren betrokken o.a. kauw- en tongspieren. De tong bestaat alleen uit spieren. Een verkeerd gebruik van deze spieren kan de stand van het gebit (ook na een orthodontische behandeling) beïnvloeden.

Logopedisten zijn erin opgeleid om afwijkend spiergebruik af te leren en de juiste mondgewoonten aan te leren door middel van Oromyofunctionele therapie.

Afwijkend monddedrag

Afwijkend monddedrag kan zijn:

1. Open monddedrag/ mondademen.
2. Foutieve slikgewoonten.
3. Foutieve spreekgewoonten.

1. Open monddedrag/ mondademen

Hiervan spreken we als de lippen steeds geopend zijn. Vaak ligt de tong dan slap tegen of op de ondertanden en is er sprake van mondademen. De zware, slappe tong kan de tanden naar voren duwen en de lippen geven dan geen tegendruk.

2. Foutieve slikgewoonten

Bij een verkeerde manier van slikken wordt met de tong krachtig tegen de tanden geduwd. Het gevolg is dat de tanden weggedrukt worden naar voren en opzij (tongpers). Er kan een open beet ontstaan.

3. Foutieve spreekgewoonten

Als de tong gewend is om steeds de tanden te raken (in rust en tijdens slikken), zal dit ook tijdens het spreken gebeuren. Vooral bij de t/d/n/l/s/z zal de tong naar voren komen. Als dit hoorbaar noemen we dit slissen.

Oorzaak afwijkend monddedrag

Duim-, vinger- of langdurig speenzuigen kan de oorzaak zijn van deze afwijkende mondgewoonten. Als hier tijdens de logopedische behandeling nog sprake van is zal er zeker aandacht aan besteed worden.

De behandeling

De behandeling omvat gemiddeld 10-20 sessies (dit kan individueel variëren), eerst wekelijks, daarna met langere tussenpozen.

Werkwijze

De eerste keer bekijkt de logopedist de mondfuncties, de gebitsstand, de totale lichaamshouding en de mondgewoonten. Afhankelijk van deze onderzoekgegevens wordt de inhoud van de behandeling bepaald. Er wordt gewerkt aan het versterken en trainen van de goede tong-, lip- en kaakbewegingen.

Na elke behandeling worden oefeningen meegegeven want alleen door regelmatig oefenen is verandering mogelijk.

Belangrijk

Doorzettingsvermogen en motivatie zijn voorwaarden voor een succesvolle behandeling.

Verwijzing

De logopedische therapie vindt plaats na verwijzing van de orthodontist, tandarts, huisarts of specialist en wordt volledig vergoed door de ziektekostenverzekeraars.